



XXXIX

CONGRESO DE MEDICINA GENERAL,
EQUIPOS DE SALUD Y ENCUENTROS
CON LA COMUNIDAD



XXXIX Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Encuentros con la Comunidad. 15 al 18 de noviembre de 2024

Resúmenes de trabajos presentados

ID	15	CATEGORIA
		GESTION
MUCHACHA HACETE EL TEST DE VPH: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COTEST (TEST DE VPH + PAP) PARA EL TAMIZAJE Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN POBLACIÓN GENERAL USUARIA DEL ÁREA DEL HOSPITAL D.F SANTOJANNI.		
AUTORES	ANDINA, Leticia (25393453); MENESTRINA, Marisa (22791519); QUIROGA, Lucia (32131341), MAZUR, Viviana (17030008); BARBIERI, Natalia (27941345); ALVAREZ CARDENAS, Sonia (25786224)	
PARTICIPANTES	ISRAELOFF, Natalia (27777890); CASTRO, Candela (30820837)	
HOSPITAL SANTOJANNI Y AREA PROGRAMATICA; HOSPITAL SANTOJANNI Y AREA PROGRAMATICA; CABA; COMUNA 8, CABA		
luciaantonelaquirola@gmail.com		
Si bien el cáncer cérvicouterino es casi completamente prevenible a través del diagnóstico temprano de lesiones producidas por el VPH, en la Argentina es el tercero más frecuente entre las personas con cuello uterino. El sistema público de salud de la CABA incorporó al rastreo de CCU el tamizaje con test de VPH recién en agosto del 2023. Objetivo: Describir y analizar el proceso de implementación de Co-test, PAP/test VPH, en el Hospital de Agudos DF Santojanni y su Área programática como estrategia de tamizaje de CCU durante la primera etapa. Material y Método: Estudio poblacional descriptivo observacional de corte retrospectivo y transversal. Enfoque metodológico cuantitativo. Resultados: Se realizaron 1451 test de VPH con un porcentaje de positividad general del 14%. Para el 94% de la muestra estudiada fue la 1° vez que realizaban el test de VPH. El tiempo promedio transcurrido entre la toma de muestra y el resultado fue de 17 días y se extendió a 23 días en los casos que correspondía evaluar el Pap. Del total de POSITIVOS sólo un 9% requirió resolución quirúrgica. Discusión y Conclusiones: Indicadores en consonancia a las metas propuestas. Fluidez en la comunicación entre primer y segundo nivel de atención. Resulta difícil tanto para los equipos de salud como para usuarias incorporar nuevas estrategias de tamizaje sin embargo la participación en microgestión de políticas es el camino hacia adueñarse y recuperar el sentido de las prácticas.		
Pap; Ccu; Test Vph; Tamizaje; Trabajo En Salud		



15 al 18
NOVIEMBRE | SANTA ROSA
LA PAMPA

